



បច្ចេកទេស ស្តីពី ផលិតកម្មល្ងសរីពាង



ការអនុវត្តតាមកសិអេកូឡូស៊ី

ថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៥



ដោយលោក មាន សាឡើង ប្រធានគម្រោង

១

ដំណើរការចងក្រងសៀវភៅបច្ចេកទេសផលិតកម្មល្ងសរីរាង្គ

២

ការដំណើរការផលិតកម្មល្ងសរីរាង្គ

៣

បច្ចេកទេសផលិតកម្មល្ងសរីរាង្គ

៤

សញ្ញាណជាតិជ័យ និងកត្តាប្រឈមនៃផលិតកម្មល្ងសរីរាង្គ



ចងក្រងដោយ៖ អង្គការអ្នកប្រកួតប្រជែង និងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (AVSF)
សហការជាមួយ៖ សហគមន៍សហគមន៍កសិកម្ម ព្រះវិហារមាត់ជ័យ (PMUAC)
កំណែទម្រង់៖ ខែមិថុនា ២០២៥

ឧបត្ថម្ភដោយ៖    

១. ដំណើរការចងក្រងសៀវភៅ បច្ចេកទេសផលិតកម្មល្ងសរីរាង្គ

ការចងក្រងសៀវភៅបច្ចេកទេសផលិតកម្មល្ងសរីរាង្គ

១) ការរៀបចំប្លង់សៀវភៅ

- ❖ ប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេស
- ❖ រៀបចំទម្រង់/គ្រោងឆ្លឹង
- ❖ កំណត់គោលបំណងនៃមេរៀន
- ❖ កំណត់ខ្លឹមសារ/មាតិកា

២) ការសិក្សាឯកសារយោង

- ❖ មេរៀនបច្ចេកទេសផលិតកម្មល្ង
- ❖ ច្បាប់ស្តង់ដារសរីរាង្គរបស់អឺរ៉ុប
- ❖ ច្បាប់ស្តង់ដារសរីរាង្គរបស់អាមេរិក

**ដំណើរការចងក្រង
សៀវភៅបច្ចេកទេស
ផលិតកម្មល្ងសរីរាង្គ**

៣) ការចុះសិក្សាពីការដាំដុះល្ងដោយកសិករ

- ❖ ព្រាងបញ្ជីសំណួរដឹកនាំសំខាន់ៗ
- ❖ ចុះជួបកសិករដាំដុះល្ង នៅខេត្តព្រះវិហារ
- ❖ ស្វែងយល់ពីការអនុវត្តបច្ចេកទេសដាំល្ង

៤) ការចងក្រងសៀវភៅបច្ចេកទេស

- ❖ សំយោគលទ្ធផលនៃការចុះប្រមូលព័ត៌មាន
- ❖ ចាប់ផ្តើមចងក្រងសៀវភៅបច្ចេកទេសដាំល្ង
- ❖ ផ្តល់មតិយោបល់ និងកែសម្រួលលើសេចក្តី
ព្រាងនៃសៀវភៅបច្ចេកទេសដោយក្រុមការងារ
- ❖ បង្កើយ និងបោះពុម្ពសៀវភៅបច្ចេកទេសដាំល្ង

២. ការដំណើរការ ផលិតកម្មល្អសរីរាង្គ

ជំហានសំខាន់ៗនៃផលិតកម្មលូសរីរាង្គ

ជំហានទី ១៖ កំណត់
និងអនុម័តជ្រើសរើស
កសិករ និងដីដាំលូ

- ❖ ដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិកក្រុមផលិតកម្មលូសរីរាង្គ
- ❖ ត្រួតពិនិត្យគុណវុឌ្ឍិរបស់កសិករ និងការអនុលោមលើដីស្រែដែលបានអនុម័តដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យ
- ❖ ប្តេជ្ញាចិត្តរបស់កសិករក្នុងការគោរពតាមច្បាប់ផលិតកម្មលូសរីរាង្គ

ជំហានទី ២៖
ការបណ្តុះបណ្តាល
បច្ចេកទេសដល់
កសិករ

- ❖ បង្រៀនពីបច្ចេកទេសផលិតកម្មលូសរីរាង្គ
- ❖ បង្រៀនពីការកត់ត្រាសៀវភៅកសិករលើផលិតកម្មលូសរីរាង្គ

ជំហានទី ៣៖
ការអនុវត្តបច្ចេកទេស
ដាំដុះលូសរីរាង្គ

- ❖ រយៈពេលនៃការកែប្រែដីដីអសរីរាង្គទៅដីសរីរាង្គ
- ❖ ការកំណត់តំបន់ការពារ
- ❖ ការជ្រើសរើសគ្រាប់ពូជ
- ❖ ការរៀបចំដី
- ❖ វិធីសាស្ត្រដាំដុះ
- ❖ ការថែទាំដំណាំ
- ❖ ការប្រមូលផល និងក្រោយពេលប្រមូលផល

ជំហានទី ៤៖
ការលក់លូសរីរាង្គ

- ❖ ការដឹកជញ្ជូនលូសរីរាង្គទៅកន្លែងប្រមូលផ្តុំដែលបានកំណត់
- ❖ ការប្រើប្រាស់សំបកវេចខ្ចប់ថ្មី ឬស្អាតដាក់លូ
- ❖ ការកត់ត្រាពីបរិមាណលូលក់ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
- ❖ ការរក្សាទុករាល់ឯកសារលក់លូសរីរាង្គ

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ
ដោយស្ថាប័នឯករាជ្យ

៣.បច្ចេកទេស ផលិតកម្មល្អសរីរាង្គ

សេចក្តីផ្តើម



- ❑ លូ ជាដំណាំមួយដែលមានវ័យចាស់ៗជាងគេ នៅលើពិភពលោក (រកឃើញដំបូងគេនៅឧបទ្វីបអាហ្វ្រិច) ។
- ❑ លូ ជាប្រភេទដំណាំដែលមានភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងភាពរាំងស្ងួត ដោយសារប្រព័ន្ធឫសរបស់វាចាក់ចូលជ្រៅទៅក្នុងដី។
- ❑ លូ ជារុក្ខជាតិដែលសម្បូរសារធាតុប្រេងខ្ពស់(៥០%) ។
- ❑ ដំណាំលូ ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើន និងសម្បូរដោយសារធាតុចិញ្ចឹម សម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយមនុស្ស និងសត្វ៖
 - ❖ ប្រូតេអ៊ីន ជាតិដែក កាល់ស្យូម កាបូនអ៊ីដ្រាត វីតាមីនប៊េ១(B1)
 - ❖ ជាវត្ថុធាតុដើម ផលិតសាប៊ូដុសខ្លួន សាប៊ូកក់សក់ ថ្នាំលាប ទឹកអប់
 - ❖ ផលិតជា ឱសថក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗ និងថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត

ភាពខុសគ្នារវាង ការដាំលូសរីរាង្គ និងការដាំលូតាមទម្លាប់

ការដាំលូសរីរាង្គ

សំដៅលើការអនុវត្តតាមដូចខាងក្រោម៖

- គោលការណ៍ធម្មជាតិ
- តាមស្តង់ដារសរីរាង្គណាមួយ
- មិនប្រើធាតុចូលគីមី(ជីគីមី ថ្នាំពុលកសិកម្ម)
- នាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភាពនៃប្រព័ន្ធជីវចម្រុះ
សកម្មភាពជីវសាស្ត្រដ៏ សុខុមាលភាពមនុស្ស និងសត្វ



ការដាំលូតាមទម្លាប់

ជាការដាំដុះល្អដែល

- មិនតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ស្តង់ដារសរីរាង្គ
- ប្រើធាតុចូលកសិកម្ម ដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីហាម
ឃាត់ (ជីគីមី ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ សត្វល្អិត ជំងឺ)



ផលប្រយោជន៍នៃការដាំល្វសរីកដុះ



លក់បានតម្លៃខ្ពស់សមរម្យ



សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ



កាត់ចំណាយ

ទិញដីគីមី ថ្នាំពុលកសិកម្ម...



កាត់ចំណាយការព្យាបាលជំងឺ

បទបង្ហាញពី ផលិតកម្មល្វសរីកដុះ




រក្សាជីវចម្រុះ

៣.១ រយៈពេលនៃការកែប្រែដី និងតំបន់ការពារ

រយៈពេលនៃការកែប្រែដី

ឆ្នាំទី ១ (១២ខែ)	ឆ្នាំទី ២ (១២ខែ)	ឆ្នាំទី ៣ (១២ខែ)	ក្រោយរយៈពេល ៣ឆ្នាំ (៣៦ ខែ)
			
រយៈពេលនៃការកែប្រែដីបានពេញលេញ៖ ៣៦ ខែ			ដំណាំល្អ អាចលក់ជា “សរីរាង្គ”



តំបន់ការពារ

សំដៅដល់តំបន់ដែលខណ្ឌចែកព្រំប្រទល់ រវាងទីតាំងផលិតកម្មកសិកម្មសរីរាង្គ និងទីតាំងផលិតកម្មកសិកម្មតាមទម្លាប់។

- ❖ ជ្រើសរើសទីតាំងដាំល្អសរីរាង្គឱ្យខ្ពស់ជាង ទីតាំងផលិតកម្មកសិកម្មតាមទម្លាប់អ្នកជិតខាង
- ❖ ធ្វើទំនប់ ឬលើកភ្លឺឱ្យបានធំ និងរឹងមាំ
- ❖ ដាំរុក្ខជាតិធ្វើជារបងរស់ ដើម្បីការពារការសាយភាយសារធាតុគីមីហាមឃាត់ពីដំណាំអសរីរាង្គអ្នកជិតខាង
- ❖ ដឹកប្រឡាយបង្គុរ និងបញ្ចៀសទឹកជុំវិញចម្ការល្អសរីរាង្គអ្នក ដើម្បីបង្វែរ ផ្លូវទឹកពីដំណាំអសរីរាង្គអ្នកជិតខាង។



៣.២ ការជ្រើសរើសពូជ



- ❶ លូស ជាប្រភេទលូដែលមានអាយុកាលដាំដុះខ្លីជាង ឬស្រាលជាងលូខ្មៅ។ អាយុកាលរបស់វា មានរយៈពេលពី ៧០ថ្ងៃទៅ ៩០ថ្ងៃ ដោយគិតចាប់ថ្ងៃដាំដុះ រហូតដល់ថ្ងៃប្រមូលផល។
- ❷ លូខ្មៅ ជាប្រភេទលូដែលមានអាយុកាលដាំដុះវែងជាង ឬក៏ធ្ងន់ជាងលូស។ អាយុកាលរបស់វា មានរយៈពេលពី ៩០ថ្ងៃទៅ ១៥០ថ្ងៃ ដោយគិតចាប់ថ្ងៃដាំដុះ រហូតដល់ថ្ងៃប្រមូលផល។

- ❑ ជាពូជសុទ្ធល្អ សាច់ណែនល្អ មិនស្លៀតស្លិន និងស្គាល់ប្រភពច្បាស់លាស់
- ❑ ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់
- ❑ មានដំណុះចាប់ពី ៨៥%ឡើង ហើយគ្មានជំងឺ និងសត្វ ល្អិតបំផ្លាញ
- ❑ ធន់នឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ និងកត្តាចង្រៃនានាក្នុងតំបន់ដាំដុះ
- ❑ មានតម្រូវការច្រើននៅលើទីផ្សារ និងតំលៃខ្ពស់សមរម្យ។

គ្រាប់ពូជលូដែលអនុញ្ញាតឱ្យដាំ

- ពូជលូសរីរាង្គ
- ករណីគ្មានពូជលូសរីរាង្គ គ្រាប់ពូជលូធម្មតាដែលគ្មានត្រាំ/ប្រឡាក់ថ្នាំគីមីហាមឃាត់ អនុញ្ញាតឱ្យដាំបាន ប៉ុន្តែត្រូវលាងសម្អាត មុនធ្វើការដាំដុះ។
- ការស្តុកគ្រាប់ពូជលូ គឺត្រូវស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ស្តង់ដារសរីរាង្គដែលបានកំណត់ ដូចជា ប្រើសំបកបារីស្លាត កន្លែងទុកលូគ្មានការឆ្លងសារធាតុគីមីហាមឃាត់។



គ្រាប់ពូជលូហាមដាំ

- ❑ ហាមដាំគ្រាប់ពូជលូ ដែលជាផលិតផលសារពាង្គកាយកែច្នៃស្បែកណេទិច(GMO)។
- ❑ ហាមដាំគ្រាប់ពូជលូអសរីរាង្គ ដែលមានត្រាំ/ប្រឡាក់ថ្នាំគីមី ឬលាយឡំធាតុកខ្វក់ ឬប្រព្រឹត្តិកម្មគីមី ។

៣.៣ ការរៀបចំដី

ក) ការជ្រើសរើសទីតាំង

- ដីទួល ផ្ទៃរាបស្មើ និងមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកបានល្អ (មិនជាំទឹក)។
- ដីដែលមានជីជាតិល្អ ជាពិសេសដីល្បាប់។
- ចៀសវាងដីទំនាបដែលមិនជ្រាបទឹកល្អ(ជាំទឹក) ឬគ្មានប្រព័ន្ធ រំដោះទឹក។



⚠ បម្រាម/លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

- ត្រាក់ទ័រ ឬគោយន្តក្នុងការរាស់ មិនត្រូវប្រើប្រាស់លាយឡំគ្នា រវាងចម្ការលូសរីករាង និងដំណាំអសរីករាងឡើយ។
- ករណីប្រើប្រាស់លាយឡំគ្នា ត្រាក់ទ័រ ឬគោយន្តក្នុងនោះ ត្រូវលាងសម្អាតដោយប្រើទឹកស្អាត ឬវិធីផ្សេងៗ ដែលធានាថាគ្មានការឆ្លងសារធាតុគីមីហាមឃាត់ មុននឹងយកទៅក្នុងការរាស់ដីចម្ការលូសរីករាង។

ខ) ការរៀបចំដី

- ❖ ក្នុងដីឱ្យបានឆាប់ នៅពេលដីសើម។
- ❖ ក្នុងរាស់យ៉ាងហោចពី ២ ឬ ៣ដង មុននឹងធ្វើការដាំដុះល្ងះ
 - ក្នុងលើកទី ១៖ ជម្រៅពី ២ ទៅ ២,៥ តីក ហើយហាលដីបាន ៧-១០ថ្ងៃ មុននឹងក្នុងលើកទី២។
 - ក្នុងលើកទី ២៖ ជម្រៅ ១,២ ទៅ ២ តីក។
 - ករណី ដីមិនសូវសម្បូរជីជាតិ ត្រូវដាក់ជីទ្រាប់បាត (ជីធម្មជាតិ ជីកំប៉ុស្ត លាមកសត្វ...) ដោយពង្រាយឱ្យពេញដី មុនពេលចាប់ផ្តើមក្នុង។
 - ក្រោយក្នុងរាស់ ត្រូវរាស់ដីឱ្យបានពី ២ ទៅ ៣ដង ធ្វើបែបនេះឱ្យដីម៉ត់ល្អ និងដីធូរមិនក្តាំងរឹង។
- ❖ ឆ្លុះចង្កូរជារង និងរៀបចំប្រព័ន្ធរំដោះទឹកនៅជុំវិញស្រែ។

៣.៤ វិធីសាស្ត្រដាំដុះ

❖ ពេលវេលាដាំដុះ

- នៅរដូវវស្សា គេច្រើនដាំដុះនៅដើមរដូវវស្សា និងនៅពាក់កណ្តាលរដូវវស្សា រវាងខែកញ្ញា និងខែតុលា។
- នៅរដូវប្រាំង គេច្រើនដាំដុះនៅពាក់កណ្តាលរដូវប្រាំង និងនៅចុងរដូវប្រាំង រវាងខែមីនា និងមេសា។

❖ វិធីដាំ

- គួរដាំល្ង ពេលដីមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់
- គួរលាយគ្រាប់ពូជល្ងជាមួយដីម៉ត់ល្អ ដើម្បីព្រោះគ្រាប់ល្ង បានស្មើល្អ និងឯកសណ្ឋាន
- គំលាតជួរពី ៥០-៦០ស.ម និងចន្លោះគុម្ពពី ៣៥-៤៥ស.ម តែអាស្រ័យលើដីជាតិដី។
- ដាំជាជួរ ជម្រៅរណ្តៅដាំល្ងពី ២-៣,៨ស.ម ហើយ ១រណ្តៅដាក់ ២-៣ គ្រាប់។
- បរិមាណគ្រាប់ពូជល្ង ប្រើពី ៨-១០ គ.ក្រ/ហ.ត សម្រាប់ឆ្លុះដាំជាជួរ និងពី ១០-១២ គ.ក្រ/ហ.ត សម្រាប់ព្រោះដោយដៃ។



👉 **ចងចាំ៖** ការដាំល្ងនៅដើមរដូវវស្សា គឺត្រូវលែយ៉ាងណាឱ្យពេលវេលាប្រមូលផល ចៀសផុតពេលដែលមានភ្លៀងច្រើន និងជាប់ៗគ្នាដែលនាំឱ្យពិបាកទាំងការប្រមូលផល និងទាំងការហាលសម្លា។

៣.៥ ការពូនគល់ និងការគ្រប់គ្រងជីជាតិដី

ក) ការរម្ងស់កូន ការជម្រះស្មៅ និងពូនគល់

- រម្ងស់កូន ត្រូវដកចេញ ក្រោយដាំ បាន ១៣ ថ្ងៃ ដោយរក្សាទុកកូន ២-៣ដើម/គុម្ព ដែលសុខភាពល្អ។
- ជម្រះស្មៅ និងពូនគល់ ចាប់ផ្តើមធ្វើបន្ទាប់ពីដាំបាន ២៣ ថ្ងៃ ហើយ ត្រូវធ្វើបាន ១- ២ដង/វដ្តជីវិតរបស់ល្អ។



⚠ បម្រាម/លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

- ហាមប្រើថ្នាំពុលកសិកម្ម ឬសារធាតុគីមីហាមឃាត់ ក្នុងការបាញ់សម្លាប់ស្មៅ ឬព្រៃល្អាស់ ។
- គ្រប់សម្ភារ ឬឧបករណ៍(ចប កាំបិត បក ខ្នាវ...) មិនត្រូវប្រើលាយឡំគ្នា រវាងចម្ការល្អសរីរាង្គ និងដំណាំអសរីរាង្គផ្សេងៗឡើយ ។
- ករណីប្រើលើដំណាំអសរីរាង្គ គ្រប់សម្ភារ ឬឧបករណ៍ទាំងនោះ ត្រូវតែលាងសម្អាតដោយទឹកស្អាត ឬវិធីផ្សេងៗ ដែលធានាថា គ្មានឆ្លងសារធាតុគីមីហាមឃាត់ មុននឹងយកមកប្រើលើចម្ការល្អសរីរាង្គ។



ខ) ការគ្រប់គ្រង និងការបង្កើតជីជាតិដី

ដើម្បីកែលម្អគុណភាពដី និងប្រើប្រាស់ដី ប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ វិធានដីចម្រុះត្រូវអនុវត្ត៖

- ការដាំដំណាំឆ្លាស់
- ដំណាំបង្វិល
- ការប្រើជីស្រស់
- ជីកំប៉ុស្ត



⚠ បម្រាម/លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

- ហាមប្រើជីគីមី និងជីសរីរាង្គដែលគ្មានលិខិតបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់ស្តង់ដារសរីរាង្គពីស្ថាប័នវាយតម្លៃស្តង់ដារសរីរាង្គកក្សាខាងក្រៅ។
- ហាមប្រើលក្ខខណ្ឌសត្វដែលចិញ្ចឹមបែបអាជីវកម្ម (ផ្តល់ចំណីរោងចក្រ) កាកសំណល់ផ្ទះបាយ (ផ្ទុកសារធាតុគីមី) សម្រាប់ផ្សំជាជីធម្មជាតិ ឬជីកំប៉ុស្តឡើយ។
- ហាមប្រើកាកសំណល់របស់មនុស្ស (លាមក ទឹកម៉ូតូ សំណល់ពីបង្គន់ ។ល។) ដើម្បីជាជីសម្រាប់ប្រើលើដំណាំល្អសរីរាង្គឡើយ។
- ហាមដុតកាកសំណល់សរីរាង្គក្នុងចម្ការដាំល្អសរីរាង្គ។



បទបង្ហាញពី ផលិតកម្មល្អសរីរាង្គ

៣.៦ ការគ្រប់គ្រងទឹក

ករណីគ្មានទឹកភ្លៀង ត្រូវស្រោចទឹក

- លើកទី១៖ នៅពេលចេញស្លឹក ៣-៤
- លើកទី២៖ នៅពេលជិតចេញផ្កា
- លើកទី៣ និង ៤៖ នៅពេលចេញផ្កា



👉 **ចំណាំ៖** កម្រិតសំណើមច្រើនពេក មុនពេលដំណុះ និងដំណាក់កាលកំពុងចេញផ្កា វាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុត ពីព្រោះអាចបង្កឱ្យកើតជំងឺផ្សិត និងជំងឺរលួយបានយ៉ាងងាយទៅលើគ្រាប់ ឫស និងផ្កា។

⚠️ បម្រាម/លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

- ហាមប្រើទឹកដែលមានឆ្លងសារធាតុគីមី ហាមឃាត់ យកមកស្រោចស្រពលើដំណាំលូសរីរាង្គ។
- ហាមប្រើប្រាស់ទឹកលើដី និងទឹកក្រោមដីសម្រាប់ធ្វើការស្រោចស្រពដំណាំលូសកម្រិតដែលធ្វើឱ្យរឹងស្លូតអស់(គ្មានទឹកសម្រាប់សត្វជីក ឬងាប់ត្រី) និងបាត់បង់គុណភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងជីវចម្រុះក្នុងតំបន់។




៣.៧ ការគ្រប់គ្រងសហសភាពចង្រៃ

ក) ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចង្រៃ



គន្លឹះនៃការអនុវត្តក្នុងវិធានការណ៍ការពារ

- ការប្រើពូជដែលធន់នឹងសត្វល្អិត
- ការដាំដំណាំឆ្លាស់
- ការដាំដំណាំរង្វិលជុំ
- ការសាបព្រួសទាន់ពេលវេលា
- ការធ្វើអនាម័យដំណាំ
- ការរក្សាពពួកសត្វល្អិតមានប្រយោន៍នៅក្នុងចម្ការល្អ។



ខ) ការគ្រប់គ្រងជំងឺ

គន្លឹះនៃការអនុវត្តក្នុងវិធានការណ៍ការពារ

- ជ្រើសរើសពូជដែលធន់នឹងជំងឺ
- ហាលដីឱ្យបានល្អ
- ដាំដំណាំឆ្លាស់ ឬចម្រុះ
- ដាំដំណាំបង្វិល។

⚠ បម្រាម/លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

- ហាមប្រើថ្នាំពុលគីមី ដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺ និងសត្វល្អិតចង្រៃ
- គ្រប់វត្ថុធាតុដើមដែលផ្សំជាថ្នាំពុលធម្មជាតិ សម្រាប់កម្ចាត់សត្វល្អិត ឬជំងឺ មិនត្រូវឆ្លងសារធាតុគីមី ឬលាយឡំធាតុកខ្វក់។
- ហាមប្រើថ្នាំជក់ (ថ្នាំខ្លាំង) ដែលមានសារធាតុនីកូទីន សុទ្ធមកធ្វើជារុក្ខជាតិផ្សំសម្រាប់កម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃ។



៣.៨ ការប្រមូលផល និងក្រោយពេលប្រមូលផល

ក) ការប្រមូលផល

សញ្ញានៃដំណាំល្អដែលអាចប្រមូលបាន

- ផ្លែល្អទុំបាន ៧៥% និងប្រែជាពណ៌ត្នោត ហើយផ្លែត្រៀមបែកមាត់ចាប
- ដំណាំល្អចាប់ផ្តើមស្លូតនៅខាងលើកន្លែងដែលត្រូវបានកាត់/ប្រមូលផល
- ដើម និងស្លឹកបានប្រែពណ៌ពីបៃតង ទៅលឿង ហើយពីលឿង ទៅក្រហម
- ស្លឹកក៏ចាប់ផ្តើមជ្រុះពីដើម។



វិធីប្រមូលផល

- ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយដៃ ដោយប្រើកណ្តៀវ កាំបិត ឬឧបករណ៍ផ្សេងៗ ដើម្បីកាត់ដើមល្អដែលទុំនោះ។
- តែគួរចៀសវាងការប្រមូលផលល្អ ដោយដកទាំងឫស ពីព្រោះអាចឆ្លងសារធាតុកខ្វក់ ឬបង្កើតជំងឺផ្សិត(Aflatoxin)។
- បន្ទាប់មក ចងដើមល្អជាកណ្តាប់ ឬបាច់ឱ្យតឹង រួចដាក់បញ្ឈរត្រង់។
- កណ្តាប់ត្រូវចងឱ្យតឹងក្នុង ២ ឬ ៣ថ្ងៃ។
- គួរចៀសវាងដាក់កន្សោមផ្លែផ្តាច់ចុះក្រោម ឬប៉ះពាល់ជាមួយដី ដែលនាំឱ្យបាត់បង់ទិន្នផល ដោយសារចាប់ផ្តើមបែកលើដី។



៣.៨ ការប្រមូលផល និងក្រោយពេលប្រមូលផល (ត)

ខ) ក្រោយពេលប្រមូលផល

❖ ការរៀបចំទីតាំងហាល និងការហាលសំប៉ូត

- ទីតាំងហាលដែលគ្មានហានិភ័យ ស្មើល្អ ទួលខ្ពស់ គ្មានជំងឺក
- យកតង់ក្រាលពីក្រោម និងសម្រាប់ក្របពីលើនៅពេលយប់ និងពេលភ្លៀង។
- យកបាច់លូប្រមូលផលរួច ដាក់តម្រៀបបញ្ជ្រាឱ្យត្រង់ចំពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងខ្យល់។
- ហាលបាន ២ ឬ ៣ថ្ងៃរួច ត្រូវបង្វិលបាច់លូណាដែលមិនសូវចំពន្លឺ ឱ្យចំពន្លឺម្តង។
- ក្នុងរយៈពេល ២ សប្តាហ៍ បាច់លូនោះ អាចធ្វើការបោកបែនបានហើយ។

❖ ការបោកបែន ការសម្អាត និងការទុកដាក់គ្រាប់លូ

- រៀបចំកន្លែងបោកបែន និងសំអាតលូសរីរាង្គ ត្រូវនៅឱ្យដាក់ដោយឡែកពីគេ។
- ត្រូវគោះ ឬវាយបាច់លូរហូតដល់គ្រាប់លូជ្រុះអស់។
- រោយសំអាត ដោយដៃ ឬដោយឧបករណ៍រោយ។
- ពិនិត្យឃើញកម្រិតសំណើមត្រឹម៧% ចុះ ទើបវេចខ្ចប់គ្រាប់លូដោយសំបកវេចខ្ចប់ថ្មី/ស្អាត
- រក្សាទុកគ្រាប់លូសរីរាង្គ នៅកន្លែងដាច់ពីគេ ដែលសុវត្ថិភាព និងស្អាត។



⚠ បម្រាម/លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

- សម្ភារ/ឧបករណ៍ (កណ្តៀវ ល្អី តង់ គោយន្តដឹក...) ដែលប្រើក្រោយពេលប្រមូលផល មិនត្រូវប្រើលាយឡំគ្នា រវាងលូសរីរាង្គ និងកសិផលអសរីរាង្គ។
- ក្នុងករណីប្រើសម្ភារ/ឧបករណ៍នោះចូលគ្នា ត្រូវលាងសម្អាតឱ្យបានស្អាត មុននឹងយកមកប្រើលើលូសរីរាង្គ ។
- ហាមប្រើសម្ភារវេចខ្ចប់ (សំបកបេ...) ដែលធ្លាប់វេចខ្ចប់ផលិតផលគីមី យកមកវេចខ្ចប់លូសរីរាង្គ ។

សញ្ញាណប្រាសាទស័យ និង កត្តាប្រឈមនៃផលិតកម្មល្អសរីរាង្គ

ក) សញ្ញាណជាតិជ័យ

- ❑ ការចូលរួមរបស់កសិករសរុបក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ មាន ៣១ គ្រួសារ (ទិន្នផលរំពឹងជាង ៧ តោន) បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២៤ មាន ២២ គ្រួសារ (ទិន្នផលទទួលបានជិត ៣ តោន)។
- ❑ ក្នុងចំណោមកសិករសរុបឆ្នាំ ២០២៥ កសិករសរីរាង្គមានចំនួន ១៣ គ្រួសារ (ទិន្នផលរំពឹងជាង ៣ តោន) បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២៤ មាន ៣ គ្រួសារ (ទិន្នផលទទួលបាន ៣១,៥ គីឡូក្រាម)។
- ❑ បានចុះអនុស្សរណៈយោបល់រយៈពេល ៣ ឆ្នាំជាមួយអ្នកទិញនៅខាងក្រៅប្រទេស លើកសិផលល្ងសរីរាង្គ។



បិតកម្មល្ងសរីរាង្គ



ខ) កត្តាប្រឈម

- ❑ ដំណើរការបញ្ចូលដីថ្មីក្នុងក្រុមផលិតកម្មល្ងសរីរាង្គមានភាពស្មុគស្មាញ និងចំណាយខ្ពស់ យោងតាមច្បាប់សរីរាង្គថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុប។
- ❑ ការដាំដុះល្ងសរីរាង្គពិបាកជាងការដាំដុះដំណាំសរីរាង្គផ្សេងៗ (ស្រូវ ដំឡូងមី ស្វាយចន្ទី...) ជាពិសេសទៅលើការគ្រប់គ្រងស្មៅ ការប្រមូលផល។
- ❑ ដំណាំល្ងជាដំណាំបន្ទាប់បន្សំ ដែលកសិករភាគមិនមានដីជាក់លាក់សម្រាប់ការដាំដុះល្ងទេ បើធៀបជាមួយស្រូវ ដំឡូងមី ស្វាយចន្ទី ដែលមានផលលំបាកក្នុងអនុវត្តដំណាំល្ងសរីរាង្គ។



សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ របស់លោកអ្នក!

អង្គការអ្នកកៀ្រមសាស្ត្រ និងពេទ្យសត្វគ្នានព្រំដែន (AVSF)

#24, Street 79BT, Village of Chamroeun Phal, Sangkat Boeung Tumpon 1, Khan Meanchey, PO Box 902, Phnom Penh, Cambodia

Tel/Fax: +855 (0)23 215 037/ Email: avsf@online.com.kh / www.avsf.org / www.ruralter.org

Association with recognized charitable status